

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES







REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°29 du 29 Octobre 1998- 2 pages

COLZA: stade B6 à B8.

Pucerons

Les conditions actuelles sont défavorables à ces ravageurs. Maintenir la surveillance des parcelles.

Phoma

Situation-Préconisation

Des projections **importantes** ont été observées du 23 au 27. Ne plus envisager d'intervention (stade « limite » de sensibilité dépassé).

CEREALES (stade levée

à 2 feuilles)

Pucerons

Les captures à la tour sont très faibles mais la surveillance des parcelles non traitées Gaucho reste indispensable.

Limaces

Surveiller et intervenir si nécessaire, les conditions humides actuelles leur sont très favorables alors que la culture et se trouve à un stade de grande vulnérabilité.

MAIS SESAMIE

Résultats des sondages larvaires

Effectués sur 247 parcelles (dont 103 en Charente-Maritime), ils mettent en évidence des populations larvaires assez faibles :

En Charente-Maritime : les niveaux d'infestations les plus élevés se situent dans la partie Sud-Ouest du département avec un nombre de larves par plante (en moyenne cantonale) de l'ordre :

- 0,5 à 1 : cantons de Montendre et Archiac ;
- 0,3 à 0,5 : cantons de La Tremblade, Mirambeau.

Avec un nombre de larves par plante compris entre 0,15 et 0,25 les secteurs d'Aulnay, Jonzac, Montlieu, Saint Genis, Saujon sont nettement moins attaqués.

En Charente, la sésamie est présente dans les secteurs d'Aigre, Mansle, Saint Amand de Boixe ainsi que dans le sud du département de façon plus diffuse (Aubeterre, Montmoreau, Blanzac).

Dans ces secteurs, le nombre de larves par pied est compris entre 0,15 et 0,35.

En Deux-Sèvres, la sésamie n'est présente que de façon ponctuelle (Frontenay Rohan Rohan).

Service Régional de la Protection des Végétaux 13 route de la Forêt 86580 BIARD 105.49.62.98.25 Fax: 05.49.62.98.26

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de POITOU-CHARENTES

Le Directeur-Gérant : L. JUILLARD CONDAT

Publication périodique C.P.P.A.P. nº 2139 AD ISSN n°02294 470



Bulletin d'inscription page 2



MAIS: bilan sésamie




Lutte préventive

Broyer les cannes et déchaumer les collets dès la récolte permet de limiter le stock larvaire. La mise en oeuvre de cette lutte préventive reste indispensable dans les secteurs les plus infestés.

SESAMIE 1998

Nombre de larves par plante (moyenne par canton)



REMARQUE : la sésamie n'est pas présente en Vienne

BULLETIN D'INSCRIPTION

à retoumer avant le 10 Novembre 1998 pour la bonne organisation de la Journée

M., Mme,	Melle :		
Société/Organisme :		Observateur P	V Oui 🗆 Non 🗆
désire s'in	scrire à la Journée Régionale 1998		1300
Repas	Oui 🗆 Non 🗆	Facture	OUI Non
Frais d'ins	cription : Repas + Recueil 98 = 200 F Recu	eil 98 seul = 100 F.	
Réglemen	par chèque à l'ordre de la FREDEC - Inscri	otion gratuite pour le	s observateurs